

# 国家食品药品监督管理局

## 国家药品标准制订件

批件号: XGB2011-123

药品名称	药品通用名称: 齐多夫定胶囊 汉语拼音名: Qiduofuding Jiaonang 英文名: Zidovudine Capsules
实施规定	为保证临床应用安全有效、质量可控, 现制订齐多夫定胶囊的质量标准。本标准自实施之日起执行, 其他有关事宜参照国家食品药品监督管理局“关于实施《中国药典》2010年版有关事宜的公告(2010年第43号)”执行。
标准编号	WS1-XG-015-2011
实施日期	2012年2月29日
附 件	齐多夫定胶囊药品标准
主送单位	各省、自治区、直辖市(食品)药品监督管理局及(食品)药品检验所
抄送单位	国家药典委员会, 中国食品药品检定研究院, 国家食品药品监督管理局药品审评中心。
备 注	



# 国家食品药品监督管理局

## 国家药品标准

WS-I-XG-015-2011

### 齐多夫定胶囊

Qiduofuding Jiaonang

Zidovudine Capsules

本品含齐多夫定 ( $C_{10}H_{13}N_5O_4$ ) 应为标示量的 90.0%~110.0%。

**【性状】** 本品为胶囊剂，内容物为白色至棕色颗粒或粉末。

**【鉴别】** (1) 取溶出度项下的供试品溶液，照紫外-可见分光光度法（中国药典 2010 年版二部附录 IV A）测定，在 265nm 的波长处有最大吸收。

(2) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

**【检查】 有关物质** 取装量差异项下的内容物，研细，混匀，精密称取适量（约相当于齐多夫定 100mg），加流动相溶解并定量稀释制成每 1ml 中约含 1mg 的溶液，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液；精密量取 1ml，置 100ml 量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；另取胸腺嘧啶对照品，精密称定，加流动相溶解并定量稀释制成每 1ml 中含 10 $\mu$ g 的溶液，作为对照品溶液。照含量测定项下色谱条件，取对照溶液 10 $\mu$ l 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的 25%，再精密量取供试品溶液、对照溶液与对照品溶液各 10 $\mu$ l，分别注入液相色谱仪，记录供试品溶液色谱图至主成分峰保留时间的 3 倍。供试品溶液色谱图中如有与对照品溶液色谱图中胸腺嘧啶保留时间一致的峰，按外标法以峰面积计算，其含量不得过齐多夫定标示量的 1.0%；其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积（1.0%），其他杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的 2 倍（2.0%）。

**溶出度** 取本品，照溶出度测定法（中国药典 2010 年版二部附录 X C 第一法），以水 900ml 为溶出介质，转速为每分钟 100 转，依法操作，经 30 分钟时，取溶液适量，过滤，精密量取续滤液适量，加水稀释至每 1ml 中约含 15 $\mu$ g 的溶液，作为供试品溶液；另取齐多夫定对照品适量，精密称定，加水溶解并稀释制成每 1ml 中约含 15 $\mu$ g 的溶液，作为对照品溶液。取上述两溶液，照紫外-可见分光光度法（中国药典 2010 年版二部附录 IV A），在 265nm 的波长处分别测定吸光度，计算每片的溶出量。限度为标示量的 80%，应符合规定。

**其他** 应符合胶囊剂项下有关的各项规定（中国药典 2010 年版二部附录 I E）。

**【含量测定】** 照高效液相色谱法（中国药典 2010 年版二部附录 V D）测定。

国家食品药品监督管理局 发布

国家药典委员会 审定

**色谱条件与系统适用性试验** 用十八烷基键合硅胶为填充剂；以甲醇-水（30: 70）为流动相；检测波长为 265nm。精密称取 3'氯-3'脱氧胸苷、齐多夫定对照品各 10mg，置同一 100ml 量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，取 10μl 注入液相色谱仪，记录色谱图。理论板数按齐多夫定峰计算不低于 2000，齐多夫定峰与 3'氯-3'脱氧胸苷峰的分离度应大于 2.0。

**测定法** 取本品装量差异项下的内容物，研细，混合均匀，精密称取适量（约相当于齐多夫定 100mg），置 100ml 量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液 10ml，置 100ml 量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另精密称取齐多夫定对照品适量，加流动相溶解并定量稀释制成每 1ml 中约含 0.1mg 的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两溶液各 10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。按外标法以峰面积计算，即得。

**【类别】** 抗病毒药。

**【规格】** （1）0.1g （2）0.25g （3）0.3g

**【贮藏】** 遮光，密封保存。